


【第81回】南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会
【第459回】地震防災対策強化地域判定会

—産業技術総合研究所資料—

令和6年7月5日






愛知県～紀伊半島～四国における地下水等総合観測施設の分布図


文字コード	名称	ふりがな	市区町村	ページ
TYE	豊橋多米	とよはしため	愛知県豊橋市	3
TYS	豊田神殿	とよたかんの	愛知県豊田市	4
NSZ	西尾善明	にしおぜんみょう	愛知県西尾市	5
ANO	津安濃	つあのう	三重県津市	6
ICU	熊野磯崎	くまのいそざき	三重県熊野市	7
KST	串本津荷	くしもとつが	和歌山県東牟婁郡串本町	8
HGM	田辺本宮	たなべほんぐう	和歌山県田辺市	9
MUR	室戸岬	むろとみさき	高知県室戸市	10
NHK	新居浜黒島	にいはまくろしま	愛媛県新居浜市	11
SSK	須崎大谷	すさきおおたに	高知県須崎市	12
TSS	土佐清水松尾	とさしみずまつお	高知県土佐清水市	13
UWA	西予宇和	せいようわ	愛媛県西予市	14

TYE 豊橋多米 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

TYS 豊田神殿 地下水位・歪（時間値）
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

NSZ 西尾善明 地下水位・歪（時間値）
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

ANO 津安濃 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：@;月初めの補正值のギャップは、
 解析プログラムの見せかけ上のものである。

ICU 熊野磯崎 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

KST 串本津荷 地下水位・歪（時間値） (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

HGM 田辺本宮 地下水位・歪 (時間値) (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))



コメント：特記事項なし。


MUR 室戸岬 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))



コメント：特記事項なし。


NHK 新居浜黒島 地下水位・歪 (時間値)

(2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))



コメント：特記事項なし。

SSK 須崎大谷 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))




コメント：特記事項なし。

2024.4.17.
 豊後水道の地震
 M6.6

TSS 土佐清水松尾 地下水位・歪 (時間値)
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))


土佐清水松尾 気圧 [hPa] 土佐清水松尾 雨量 [mm]



コメント：特記事項なし。

2024.4.17.
 豊後水道の地震
 M6.6

UWA 西予宇和 地下水位・歪（時間値）
 (2024/04/01 00:00 - 2024/07/01 00:00 (JST))



コメント：特記事項なし。

2024.4.17.
 豊後水道の地震
 M6.6

東海・紀伊半島・四国における短期的 SSE 解析結果

産業技術総合研究所

2024年5月30日午後～6月1日にかけて、奈良県南部で深部低周波地震が観測された(図1)。図2は周辺の産総研・防災科研の観測点における歪・傾斜の観測結果である。これらの結果はBAYTAP-Gにより気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き、2024年5月16日～30日午前のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。

図3は図2[A]の変化を説明する短期的SSEの断層モデルの推定結果(Mw 5.7)である。今回の活動域付近における最近の短期的SSEの活動は、2024年5月19日午後～21日午前(Mw 5.4; 図3の灰色矩形1)、2024年2月20日～21日午前(Mw 5.3; 同2)、2024年1月2日午後～3日午前(Mw 5.7; 同3)、2023年10月11日～12日(Mw 5.3; 同4)、2022年12月30日午後～31日午前(Mw 5.3; 同5)である。(以上、前回の再掲)

2024年6月15日～17日にかけて、和歌山県中部で深部低周波地震が観測された(図4)。図5は周辺の産総研・防災科研の観測点における歪・傾斜の観測結果である。これらの結果はBAYTAP-Gにより気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き、2024年6月2日～14日のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。

図6は図5[A]の変化を説明する短期的SSEの断層モデルの推定結果(Mw 5.4)である。今回の活動域付近における最近の短期的SSEの活動は、2024年5月30日午後～6月1日午前(Mw 5.7; 図6の灰色矩形1)、2024年2月20日～21日午前(Mw 5.3; 同2)、2024年1月2日午後～3日午前(Mw 5.7; 同3)、2022年12月30日午後～31日午前(Mw 5.3; 同4)である。

2024年6月16日午後～24日午前にかけて、愛知県で深部低周波地震が観測された(図7)。図8は周辺の産総研・気象庁・静岡県・防災科研の観測点における歪・傾斜の観測結果である。これらの結果はBAYTAP-Gにより気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き、2024年6月2日～16日午前のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。

図9～10は図8[A]・[B]の変化を説明する短期的SSEの断層モデルの推定結果(順に Mw 6.0, Mw 5.4)である。今回の活動域付近における最近の短期的SSEの活動は、2024年1月3日午後～4日午前(Mw 5.8; 図9～10の灰色矩形1)、2024年1月2日午後～3日午前(Mw 5.8; 同2)、2023年12月31日(Mw 5.6; 同3)、2023年12月25日～30日(Mw 5.9; 同4)、2023年12月23日～24日(Mw 5.9; 同5)、2023年10月20日午後～23日(Mw 5.9; 同6)、2023年9月15日～17日(Mw 5.8; 同7)である。

2024年6月21日～27日午前にかけて、愛媛県で深部低周波地震が観測された(図11)。図12は周辺の産総研・防災科研の観測点における歪・傾斜の観測結果である。これらの結果はBAYTAP-Gにより気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除き、2024年6月7日～20日のデータを用いて1次トレンドを除去したものである。

図13は図12[A]の変化を説明する短期的SSEの断層モデルの推定結果(Mw 6.1)である。今回の活動域付近における最近の短期的SSEの活動は、2024年4月20日～21日(Mw 6.0; 図13の灰色矩形

1), 2024年3月30日午後～4月3日午前 (Mw 5.6; 同2), 2024年3月23日午後～25日午前 (Mw 5.8; 同3), 2024年1月31日～2月4日 (Mw 5.6; 同4), 2024年1月26日午後～30日 (Mw 5.5; 同5), 2023年12月24日～31日午前 (Mw 6.0; 同6), 2023年12月5日～6日 (Mw 5.5; 同7), 2023年12月3日～4日 (Mw 5.6; 同8), 2023年12月3日～4日 (Mw 5.8; 同9), 2023年6月24日午後～30日午前 (Mw 5.4; 同10), 2023年6月21日午後～24日午前 (Mw 5.8; 同11) である。

解析方法

短期的 SSE の断層面推定には、各観測点の水平歪 4 成分、体積歪、地下水圧、もしくは傾斜 2 成分の記録を用いる。地下水圧は、O1 および M2 分潮の振幅を BAYTAP-G [Tamura et al., 1991] により計算し、GOTIC2 [Matsumoto et al., 2001] により推定した地球固体潮汐および海洋荷重潮汐 (O1 および M2 分潮) との振幅比を用いて、体積歪に変換する。歪・地下水・傾斜ともに、観測波形から BAYTAP-G により、気圧応答成分、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除く。また、イベント直前の期間を用いて 1 次トレンドも取り除く。微動活動も参考にして、数時間～半日単位で活動開始・終了時期を判断し、その期間の変化量を短期的 SSE による変化量とする。その際、歪については Matsumoto et al. [2010] の手法で理論潮汐歪を用いてキャリブレーションを行っている。

断層面の推定は、板場ほか[2012]の手法を用いて次の 2 段階で行う。1 段階目では、断層面の位置 (0.1° 間隔) とすべり量 (1-50 mm) を可変とする。幅・長さともに 20 km に固定した断層面をフィリピン海プレート境界面[弘瀬ほか, 2007]上で動かし、各位置での最適なすべり量を探す。結果を示す図には、それぞれの位置で残差を最小にするすべり量を与えたときの、観測値とそのすべり量による計算値 (Okada [1992] による) との残差の総和の分布を示している。これにより、短期的 SSE が生じている可能性が高い領域を絞り込むとともに、次の 2 段階目で推定された結果の任意性を確認することができる。2 段階目では、1 段階目で絞り込んだ領域付近で、断層面の位置 (0.1° 間隔) ・すべり量 (1-50 mm) ・長さ (10-80 km の間で 1 km 間隔) および幅 (10-50 km の間で 1 km 間隔) を可変として残差を最小にする解を求める。ただし、計算に使用している観測点数が少ない場合や、断層面と観測点配置の関係によっては解の任意性が高くなるので注意が必要である。

なお、残差はノイズレベルによって規格化している。これは異種の観測値を統合するための処置である。ノイズレベルの定義は、気圧応答、潮汐成分およびホワイトノイズ成分を取り除いた後 (微動活動が活発な期間および周辺の日雨量 50 mm を超える時期を除く) の 24 時間階差の 2σ である。深部低周波微動の検出・震源決定には、エンベロープ相関法を用いている。

謝辞

短期的 SSE の断層モデル推定には、防災科研 Hi-net 高感度加速度計 (傾斜計) および気象庁の多成分歪計および体積歪計の記録とキャリブレーション係数を使用しました。微動の解析には、防災科研 Hi-net, 気象庁, 東京大学, 京都大学, 名古屋大学, 高知大学, 九州大学の地震波形記録を使用しました。低周波地震の震央位置表示には、気象庁の一元化カタログを使用しました。ここに記して感謝します。

参考文献

弘瀬冬樹, 中島淳一, 長谷川昭 (2007), Double-Difference Tomography 法による西南日本の 3 次元地震波速度構造およびフィリピン海プレートの形状の推定, *地震* **2**, **60**, 1-20.
板場智史, 松本則夫, 北川有一, 小泉尚嗣, 松澤孝紀, 歪・傾斜・地下水統合解析による短期的スロース

リップイベントのモニタリング, 日本地球惑星連合 2012 年大会, 千葉, 5 月, 2012.

Matsumoto, K., T. Sato, T. Takanezawa, and M. Ooe, GOTIC2: A Program for Computation of Oceanic Tidal Loading Effect, *J. Geod. Soc. Japan*, **47**, 243-248, 2001.

Matsumoto, N., O. Kamigaichi, Y. Kitagawa, S. Itaba, and N. Koizumi (2010), In-situ Calibration of Borehole Strainmeter Using Green's Functions for Surface Point Load at a Depth of Deployment, *Eos, Trans. AGU*, Abstract G11A-0626.

Okada, Y. (1992), Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, **82**, 1018-1040.

Tamura, Y., T. Sato, M. Ooe and M. Ishiguro (1991), A procedure for tidal analysis with a Bayesian information criterion, *Geophys. J. Int.*, **104**, 507-516.




図1 紀伊半島における低周波地震の時空間分布図（2024/05/28 00:00 - 2024/06/04 00:00 (JST)）。気象庁カタログによる。
 (観測点名) NSZ: 西尾善明, ANO: 津安濃, ITA: 松阪飯高, ICU: 熊野磯崎, HGM: 田辺本宮, KST: 串本津荷






図2 紀伊半島における歪・傾斜観測結果 (2024/05/16 00:00 - 2024/06/04 00:00 (JST))

[A] 2024/05/30PM-06/01

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図3 2024/05/30PM-06/01の歪・傾斜変化(図2[A])を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

1*: 2024/05/19PM-21AM (Mw5.4), 2*: 2024/02/20-21AM (Mw5.3), 3: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.7), 4: 2023/10/11-12 (Mw5.3), 5: 2022/12/30PM-31AM (Mw5.3)

*参考解析結果

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。




図4 紀伊半島における低周波地震の時空間分布図（2024/06/12 00:00 - 2024/06/21 00:00 (JST)）。気象庁カタログによる。
 (観測点名) NSZ: 西尾善明, ANO: 津安濃, ITA: 松阪飯高,
 ICU: 熊野磯崎, HGM: 田辺本宮, KST: 串本津荷






図5 紀伊半島における歪・傾斜観測結果 (2024/06/01 00:00 - 2024/06/21 00:00 (JST))

[A] 2024/06/15-17

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図6 2024/06/15-17の歪・傾斜変化 (図5[A]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

1: 2024/05/30PM-06/01 (Mw5.7), 2*: 2024/02/20-21AM (Mw5.3), 3: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.7), 4: 2022/12/30PM-31AM (Mw5.3)

*参考解析結果

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。




図7 東海における低周波地震の時空間分布図（2024/06/13 00:00 - 2024/06/27 00:00 (JST)）。気象庁カタログによる。
（観測点名）TYS: 豊田神殿, NSZ: 西尾善明, ANO: 津安濃, ITA: 松阪飯高






図8 東海・紀伊半島における歪・傾斜観測結果 (2024/06/02 00:00 - 2024/06/31 00:00 (JST))

[A] 2024/06/16PM-20

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪



(b3) 体積歪




図9 2024/06/16PM-20の歪・傾斜変化 (図8[A]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。


- 1: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 2: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8), 3: 2023/12/31 (Mw5.6), 4: 2023/12/25-30 (Mw5.9), 5: 2023/12/23-24 (Mw5.9), 6: 2023/10-20PM-23 (Mw5.8), 7: 2023/09/15-17 (Mw5.8)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。


(b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[B] 2024/06/21-24AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図10 2024/06/21-24AMの歪変化 (図8[B]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

A: 2024/06/16PM-20 (Mw6.0), 1: 2024/01/03PM-04AM (Mw5.8), 2: 2024/01/02PM-03AM (Mw5.8), 3: 2023/12/31 (Mw5.6), 4: 2023/12/25-30 (Mw5.9), 5: 2023/12/23-24 (Mw5.9), 6: 2023/10-20PM-23 (Mw5.8), 7: 2023-09-15-17 (Mw5.8)

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。




図11 四国における低周波地震の時空間分布図（2024/06/15 00:00 - 2024/06/30 00:00 (JST)）。気象庁カタログによる。
 (観測点名) ANK: 阿南桑野, MUR: 室戸岬, KOC: 高知五台山, NHK: 新居浜黒島, SSK: 須崎大谷, TSS: 土佐清水松尾, MAT: 松山南江戸, UWA: 西予宇和






図12 四国における歪・傾斜観測結果 (2024/06/02 00:00 - 2024/06/31 00:00 (JST))

[A] 2024/06/21-27AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図13 2024/06/21-27AMの歪・傾斜変化 (図12[A]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの、対応する残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。

(b1) (a)の断層面付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生した短期的SSEの推定断層面。

1*: 2024/04/20-21 (Mw6.0), 2*: 2024/03/30PM-04/03AM (Mw5.6), 3*: 2024/03/23PM-25AM (Mw5.8),
4: 2024/01/31-02/04 (Mw5.6), 5: 2024/01/26PM-30 (Mw5.5), 6: 2023/12/24-31AM (Mw6.0), 7: 2023/12/05-06 (Mw5.5)
8:2024/12/03-04 (Mw5.6), 9: 2023/12/03-04 (Mw5.8), 10: 2023/06/24PM-30AM, 11: 2023/06/21PM-24AM (Mw5.8)

*参考解析結果

(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。